

Tabella 1 - Persone di 6-64 anni con disabilità che vivono in famiglia (valori assoluti in migliaia, tassi specifici per 100 persone della stessa età e Intervalli di Confidenza al 95%) per regione e classe di età - Anni 2004-2005

| Regioni | Classi d'età | | | | | |
|-------------------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
| | 6-24 | | 25-64 | | 6-64 | |
| | N | Tassi | N | Tassi | N | Tassi |
| Piemonte | 3.547 | 0,5 (0,1-0,9) | 30.179 | 1,2 (0,9-1,6) | 33.726 | 1,1 (0,8-1,3) |
| Valle d'Aosta-Vallée d' Aoste | * | * | 622 | 0,9 (0,3-1,5) | 788 | 0,9 (0,4-1,4) |
| Lombardia | 17.042 | 1,1 (0,6-1,6) | 54.299 | 1,0 (0,7-1,3) | 71.341 | 1,0 (0,8-1,2) |
| <i>Bolzano-Bozen</i> | <i>790</i> | <i>0,8 (0,0-1,6)</i> | <i>1.034</i> | <i>0,4 (0,1-0,7)</i> | <i>1.824</i> | <i>0,5 (0,2-0,8)</i> |
| <i>Trento</i> | <i>*</i> | <i>*</i> | <i>1.430</i> | <i>0,5 (0,0-1,0)</i> | <i>1.609</i> | <i>0,4 (0,1-0,8)</i> |
| Veneto | 6.993 | 0,9 (0,4-1,3) | 25.757 | 1,0 (0,7-1,2) | 32.750 | 0,9 (0,7-1,2) |
| Friuli-Venezia Giulia | 1.864 | 1,0 (0,1-1,9) | 8.335 | 1,2 (0,7-1,7) | 10.200 | 1,2 (0,8-1,6) |
| Liguria | 3.199 | 1,4 (0,4-2,5) | 5.808 | 0,7 (0,3-1,0) | 9.007 | 0,8 (0,5-1,2) |
| Emilia-Romagna | 4.490 | 0,7 (0,2-1,2) | 20.613 | 0,9 (0,6-1,2) | 25.103 | 0,8 (0,6-1,1) |
| Toscana | 5.920 | 1,1 (0,4-1,7) | 24.273 | 1,2 (0,9-1,6) | 30.193 | 1,2 (0,9-1,5) |
| Umbria | 1.305 | 0,9 (0,0-1,8) | 6.397 | 1,4 (0,8-1,9) | 7.702 | 1,3 (0,8-1,7) |
| Marche | 819 | * | 9.163 | 1,1 (0,7-1,5) | 9.983 | 0,9 (0,6-1,2) |
| Lazio | 10.744 | 1,1 (0,5-1,7) | 38.728 | 1,3 (0,9-1,7) | 49.472 | 1,2 (0,9-1,6) |
| Abruzzo | 2.778 | 1,1 (0,4-1,8) | 8.831 | 1,3 (0,8-1,7) | 11.609 | 1,2 (0,8-1,6) |
| Molise | 625 | 1,0 (0,1-1,8) | 1.660 | 1,0 (0,4-1,5) | 2.285 | 1,0 (0,5-1,4) |
| Campania | 28.847 | 2,0 (1,5-2,6) | 53.311 | 1,7 (1,4-2,1) | 82.158 | 1,8 (1,5-2,1) |
| Puglia | 7.903 | 0,9 (0,4-1,3) | 38.882 | 1,8 (1,4-2,2) | 46.785 | 1,5 (1,2-1,8) |
| Basilicata | 1.717 | 1,3 (0,4-2,2) | 5.028 | 1,6 (1,0-2,2) | 6.745 | 1,5 (1,0-2,0) |
| Calabria | 5.322 | 1,1 (0,5-1,8) | 17.642 | 1,7 (1,1-2,2) | 22.964 | 1,5 (1,1-1,9) |
| Sicilia | 9.997 | 0,9 (0,4-1,3) | 46.232 | 1,7 (1,3-2,2) | 56.229 | 1,5 (1,2-1,8) |
| Sardegna | 2.199 | 0,7 (0,2-1,2) | 14.814 | 1,6 (1,1-2,0) | 17.013 | 1,3 (1,0-1,7) |
| Italia | 116.447 | 1,1 (0,9-1,2) | 413.038 | 1,3 (1,2-1,4) | 529.485 | 1,2 (1,1-1,3) |

*Stime di frequenze con errore relativo superiore al 75%.

Fonte dei dati e anno di riferimento: Istat. Indagine Multiscopo "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari", 2004/2005.

Tabella 2 - *Persone di 6-64 anni che vivono in famiglia e che dichiarano di percepire il loro stato di salute male o molto male (tassi grezzi per 100 persone e Intervalli di Confidenza al 95%) per regione e presenza di disabilità - Anni 2004-2005*

| Regioni | Persone con disabilità | Persone senza disabilità |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Piemonte | 35,0 (19,7-50,3) | 2,1 (1,7-2,5) |
| Valle d'Aosta- Vallée d'Aoste | * | 2,9 (2,0-3,8) |
| Lombardia | 24,5 (13,3-35,7) | 1,5 (1,3-1,8) |
| Bolzano-Bozen | * | 1,1 (0,6-1,6) |
| Trento | * | 2,3 (1,5-3,1) |
| Veneto | 29,7 (15,5-44,0) | 1,6 (1,3-1,9) |
| Friuli-Venezia Giulia | 47,3 (22,7-71,9) | 1,8 (1,3-2,3) |
| Liguria | 45,1 (15,4-74,7) | 2,2 (1,6-2,7) |
| Emilia-Romagna | 45,2 (25,4-65,1) | 2,1 (1,7-2,4) |
| Toscana | 46,8 (28,8-64,8) | 2,8 (2,3-3,3) |
| Umbria | 37,9 (14,6-61,2) | 2,8 (2,1-3,4) |
| Marche | 54,5 (26,9-82,2) | 2,5 (2,0-3,1) |
| Lazio | 44,6 (27,7-61,6) | 2,4 (2,0-2,8) |
| Abruzzo | 37,9 (18,4-57,3) | 2,0 (1,5-2,5) |
| Molise | 45,2 (13,3-77,1) | 2,0 (1,3-2,7) |
| Campania | 31,6 (22,2-41,0) | 2,1 (1,8-2,4) |
| Puglia | 44,1 (30,7-57,5) | 1,7 (1,4-2,0) |
| Basilicata | 32,5 (12,8-52,1) | 2,3 (1,7-3,0) |
| Calabria | 51,2 (31,9-70,5) | 3,0 (2,4-3,6) |
| Sicilia | 55,3 (38,8-71,8) | 2,9 (2,4-3,4) |
| Sardegna | 55,9 (35,7-76,2) | 3,1 (2,6-3,7) |
| Italia | 40,0 (35,8-44,2) | 2,1 (2,0-2,3) |

*Stime di frequenze con errore relativo superiore al 75%.

Fonte dei dati ed anno di riferimento: Istat. Indagine Multiscopo "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari", 2004/2005.

Tabella 3 - *Tassi di occupazione (per 100 e Intervalli di Confidenza al 95%) delle persone di 15-64 anni per ripartizione geografica, sesso e presenza di disabilità - Anni 2004/2005*

| Ripartizione geografica | Maschi | | Femmine | | Totale | |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Disabili | Non Disabili | Disabili | Non Disabili | Disabili | Non Disabili |
| Nord-Ovest | 31,7 (19,7-43,7) | 76,6 (75,6-77,6) | 16,5 (7,9-25,2) | 55,3 (54,1-56,5) | 23,3 (16,0-30,7) | 66,1 (65,3-66,9) |
| Nord-Est | 33,9 (22,4-45,4) | 77,3 (76,4-78,3) | 12,7 (4,1-21,3) | 58,0 (56,9-59,1) | 23,8 (16,4-31,3) | 67,8 (67,1-68,5) |
| Centro | 24,1 (14,1-34,1) | 74,5 (73,4-75,6) | 20,3 (9,6-31,1) | 52,4 (51,2-53,7) | 22,5 (15,2-29,7) | 63,3 (62,5-64,2) |
| Sud | 18,4 (12,0-24,8) | 65,5 (64,6-66,5) | 6,9 (2,9-10,9) | 32,2 (31,2-33,1) | 12,4 (8,7-16,2) | 48,7 (48,0-49,4) |
| Isole | 11,0 (2,5-19,5) | 64,6 (63,0-66,3) | * | 32,2 (30,6-33,7) | 7,3 (2,6-12,0) | 48,2 (47,1-49,4) |
| Italia | 23,7 (19,1-28,2) | 72,3 (71,9-72,8) | 11,7 (8,3-15,0) | 46,9 (46,4-47,5) | 17,5 (14,7-20,3) | 59,6 (59,3-60,0) |

*Stime di frequenze con errore relativo superiore al 75%.

Fonte dei dati e anno di riferimento: Istat. Indagine Multiscopo "Condizioni di salute e il ricorso ai servizi sanitari", 2004/2005.

Tabella 1 - Popolazione con disabilità (valori assoluti e tassi grezzi e standardizzati per 100) per classe di età e regione abitanti) - Anno 2010

| Regioni | 6-64 | 65-74 | 75+ | Totale | Tassi grezzi | Tassi std |
|------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| Piemonte | 34.392 | 29.508 | 152.103 | 216.003 | 5,1 | 4,7 (4,0-5,4) |
| Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste | 812 | 1.172 | 3.299 | 5.283 | 4,4 | 4,3 (2,9-5,7) |
| Lombardia | 73.684 | 64.962 | 251.687 | 390.333 | 4,2 | 4,3 (3,7-4,9) |
| Trentino-Alto Adige | 3.596 | 4.193 | 21.275 | 29.064 | 3,0 | 3,3 (2,5-4,0) |
| Veneto | 33.878 | 31.493 | 145.429 | 210.800 | 4,6 | 4,7 (4,0-5,3) |
| Friuli Venezia Giulia | 10.318 | 6.535 | 39.725 | 56.578 | 4,8 | 4,4 (3,5-5,3) |
| Liguria | 9.118 | 14.725 | 69.432 | 93.274 | 6,0 | 4,7 (3,8-5,5) |
| Emilia-Romagna | 26.628 | 26.021 | 137.494 | 190.143 | 4,6 | 4,1 (3,5-4,7) |
| Toscana | 31.236 | 29.114 | 133.735 | 194.085 | 5,5 | 4,9 (4,1-5,6) |
| Umbria | 8.094 | 9.231 | 35.088 | 52.413 | 6,1 | 5,4 (4,3-6,5) |
| Marche | 10.237 | 13.362 | 57.354 | 80.953 | 5,5 | 4,9 (4,0-5,8) |
| Lazio | 52.883 | 36.212 | 168.958 | 258.054 | 4,8 | 5,0 (4,2-5,8) |
| Abruzzo | 11.963 | 12.326 | 47.747 | 72.037 | 5,7 | 5,3 (4,4-6,3) |
| Molise | 2.286 | 3.327 | 13.618 | 19.232 | 6,3 | 5,7 (4,4-7,0) |
| Campania | 82.347 | 37.692 | 156.251 | 276.290 | 5,1 | 6,0 (5,2-6,8) |
| Puglia | 46.515 | 50.866 | 135.907 | 233.288 | 6,1 | 6,6 (5,8-7,4) |
| Basilicata | 6.671 | 5.394 | 23.404 | 35.469 | 6,3 | 6,2 (4,9-7,5) |
| Calabria | 22.884 | 21.786 | 68.981 | 113.652 | 6,0 | 6,3 (5,2-7,3) |
| Sicilia | 56.322 | 47.603 | 209.394 | 313.319 | 6,6 | 7,0 (6,2-7,9) |
| Sardegna | 16.894 | 14.479 | 50.844 | 82.216 | 5,2 | 5,6 (4,6-6,5) |
| Italia | 540.761 | 460.000 | 1.921.726 | 2.922.486 | 5,1 | 5,1 (4,9-5,4) |

Fonte dei dati: Istat. Indagine Multiscopo "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari", 2004-2005 e popolazione residente per età, genere e stato civile al 1 gennaio 2010.