

Tabella 1 - Tassi standardizzati (per 1.000 e Intervalli di Confidenza al 95%) di dimissioni ospedaliere potenzialmente evitabili per asma per regione - Anni 2004-2006

| Regioni | 2004 | Regioni | 2005 | Regioni | 2006 |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Piemonte | 0,10 (0,10-0,11) | Valle d'Aosta | 0,10 (0,07-0,13) | Trento | 0,06 (0,04-0,08) |
| Friuli-Venezia Giulia | 0,13 (0,12-0,14) | Piemonte | 0,11 (0,11-0,12) | Piemonte | 0,08 (0,07-0,09) |
| Marche | 0,13 (0,12-0,14) | Marche | 0,12 (0,11-0,13) | Marche | 0,09 (0,08-0,11) |
| Emilia-Romagna | 0,14 (0,14-0,15) | Basilicata | 0,13 (0,11-0,15) | Friuli-Venezia Giulia | 0,10 (0,08-0,11) |
| Valle d'Aosta | 0,15 (0,11-0,19) | Trento | 0,14 (0,12-0,16) | Toscana | 0,10 (0,09-0,12) |
| Toscana | 0,16 (0,15-0,16) | Emilia-Romagna | 0,14 (0,14-0,15) | Emilia-Romagna | 0,11 (0,10-0,12) |
| Trento | 0,16 (0,14-0,18) | Friuli-Venezia Giulia | 0,15 (0,14-0,16) | Veneto | 0,12 (0,11-0,13) |
| Lazio | 0,20 (0,19-0,20) | Toscana | 0,15 (0,14-0,16) | Liguria | 0,12 (0,10-0,14) |
| Lombardia | 0,20 (0,20-0,21) | Liguria | 0,17 (0,15-0,19) | Bolzano-Bozen | 0,12 (0,08-0,15) |
| Veneto | 0,21 (0,20-0,22) | Sicilia | 0,17 (0,16-0,18) | Lombardia | 0,12 (0,12-0,13) |
| Umbria | 0,21 (0,19-0,23) | Lazio | 0,18 (0,17-0,19) | Lazio | 0,13 (0,12-0,14) |
| Sicilia | 0,22 (0,22-0,23) | Veneto | 0,19 (0,18-0,20) | Sicilia | 0,14 (0,13-0,15) |
| Campania | 0,23 (0,23-0,24) | Lombardia | 0,19 (0,18-0,20) | Valle d'Aosta | 0,14 (0,07-0,22) |
| Liguria | 0,23 (0,22-0,25) | Umbria | 0,20 (0,18-0,22) | Basilicata | 0,16 (0,13-0,20) |
| Basilicata | 0,23 (0,21-0,26) | Puglia | 0,25 (0,23-0,26) | Umbria | 0,18 (0,15-0,21) |
| Calabria | 0,25 (0,24-0,26) | Calabria | 0,26 (0,25-0,28) | Campania | 0,20 (0,19-0,22) |
| Bolzano-Bozen | 0,26 (0,23-0,28) | Campania | 0,27 (0,26-0,28) | Puglia | 0,21 (0,20-0,23) |
| Puglia | 0,28 (0,27-0,28) | Bolzano-Bozen | 0,27 (0,24-0,30) | Calabria | 0,21 (0,19-0,24) |
| Abruzzo | 0,31 (0,30-0,33) | Abruzzo | 0,30 (0,28-0,32) | Molise | 0,22 (0,16-0,27) |
| Molise | 0,33 (0,30-0,37) | Molise | 0,32 (0,28-0,36) | Abruzzo | 0,23 (0,21-0,26) |
| Sardegna | 0,42 (0,40-0,44) | Sardegna | 0,39 (0,37-0,41) | Sardegna | 0,32 (0,29-0,35) |
| Italia | 0,21 (0,20-0,21) | Italia | 0,19 (0,19-0,20) | Italia | 0,14 (0,14-0,15) |

Nota: la standardizzazione è stata effettuata considerando come popolazione di riferimento la popolazione italiana al censimento del 2001.

Fonte dei dati e anno di riferimento: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (ex Salute). SDO - Istat. www.demo.istat.it per la popolazione. Anno 2008.

Tabella 2 - Tassi standardizzati (per 1.000 e Intervalli di Confidenza al 95%) di dimissioni ospedaliere potenzialmente evitabili per CLTD per regione - Anni 2004-2006

| Regioni | 2004 | Regioni | 2005 | Regioni | 2006 |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Marche | 0,17 (0,16-0,18) | Marche | 0,13 (0,12-0,15) | Marche | 0,19 (0,17-0,21) |
| Toscana | 0,27 (0,26-0,28) | Valle d'Aosta | 0,14 (0,09-0,19) | Umbria | 0,19 (0,16-0,22) |
| Valle d'Aosta | 0,30 (0,25-0,35) | Umbria | 0,21 (0,19-0,23) | Valle d'Aosta | 0,22 (0,13-0,31) |
| Sardegna | 0,31 (0,29-0,32) | Toscana | 0,26 (0,25-0,28) | Toscana | 0,24 (0,23-0,26) |
| Liguria | 0,32 (0,31-0,33) | Sardegna | 0,31 (0,29-0,32) | Veneto | 0,27 (0,26-0,29) |
| Emilia-Romagna | 0,33 (0,32-0,34) | Liguria | 0,31 (0,28-0,34) | Liguria | 0,27 (0,25-0,30) |
| Umbria | 0,34 (0,32-0,36) | Piemonte | 0,32 (0,30-0,33) | Sardegna | 0,29 (0,26-0,32) |
| Piemonte | 0,36 (0,36-0,37) | Emilia-Romagna | 0,37 (0,36-0,38) | Friuli-Venezia Giulia | 0,31 (0,27-0,34) |
| Friuli-Venezia Giulia | 0,40 (0,39-0,42) | Abruzzo | 0,41 (0,38-0,44) | Piemonte | 0,31 (0,29-0,32) |
| Lombardia | 0,44 (0,43-0,45) | Trento | 0,44 (0,40-0,47) | Emilia-Romagna | 0,36 (0,35-0,38) |
| Abruzzo | 0,45 (0,43-0,47) | Lazio | 0,44 (0,43-0,45) | Abruzzo | 0,39 (0,36-0,43) |
| Veneto | 0,46 (0,45-0,47) | Friuli-Venezia Giulia | 0,45 (0,43-0,46) | Trento | 0,43 (0,37-0,50) |
| Trento | 0,55 (0,51-0,58) | Lombardia | 0,45 (0,44-0,46) | Lombardia | 0,48 (0,47-0,50) |
| Bolzano-Bozen | 0,57 (0,53-0,61) | Veneto | 0,51 (0,47-0,55) | Bolzano-Bozen | 0,52 (0,45-0,60) |
| Campania | 0,58 (0,56-0,59) | Campania | 0,52 (0,51-0,53) | Lazio | 0,54 (0,52-0,57) |
| Lazio | 0,58 (0,57-0,59) | Bolzano-Bozen | 0,55 (0,51-0,59) | Campania | 0,55 (0,53-0,57) |
| Calabria | 0,76 (0,74-0,78) | Calabria | 0,71 (0,68-0,74) | Calabria | 0,68 (0,64-0,72) |
| Molise | 0,78 (0,72-0,83) | Molise | 0,76 (0,69-0,84) | Basilicata | 0,77 (0,69-0,72) |
| Puglia | 0,91 (0,89-0,93) | Basilicata | 0,80 (0,74-0,85) | Sicilia | 0,79 (0,77-0,82) |
| Basilicata | 0,92 (0,88-0,97) | Sicilia | 0,82 (0,80-0,83) | Puglia | 0,88 (0,85-0,92) |
| Sicilia | 0,95 (0,93-0,97) | Puglia | 0,85 (0,83-0,87) | Molise | 0,94 (0,83-1,05) |
| Italia | 0,51 (0,51-0,51) | Italia | 0,47 (0,47-0,48) | Italia | 0,47 (0,46-0,47) |

Nota: la standardizzazione è stata effettuata considerando come popolazione di riferimento la popolazione italiana al censimento del 2001.

Fonte dei dati e anno di riferimento: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (ex Salute). SDO - Istat. www.demo.istat.it per la popolazione. Anno 2008.

Tabella 1 - Tasso (per 1.000 residenti maggiorenni) di dimissioni ospedaliere potenzialmente evitabili per CLTD per regione: aggiustamento per età, prevalenza e ospedalizzazione generale e tasso aggiustato solo per età; differenza di posizione tra gli ordinamenti secondo le due misure del tasso - Anno 2010

| Regione | Tasso aggiustato |
|---------------------------|------------------|
| Marche | 0,08 (0,07-0,09) |
| Umbria | 0,12 (0,11-0,14) |
| Toscana | 0,13 (0,11-0,14) |
| Sardegna | 0,14 (0,13-0,15) |
| Abruzzo | 0,14 (0,13-0,16) |
| Friuli Venezia Giulia | 0,15 (0,14-0,17) |
| Veneto | 0,15 (0,14-0,16) |
| Liguria | 0,15 (0,13-0,16) |
| Piemonte e Valle d' Aosta | 0,17 (0,16-0,19) |
| Emilia-Romagna | 0,18 (0,17-0,20) |
| Trentino - Alto Adige | 0,19 (0,17-0,21) |
| Lazio | 0,22 (0,20-0,23) |
| Lombardia | 0,22 (0,21-0,24) |
| Campania | 0,24 (0,23-0,26) |
| Calabria | 0,25 (0,23-0,27) |
| Molise | 0,27 (0,25-0,30) |
| Basilicata | 0,31 (0,28-0,34) |
| Sicilia | 0,34 (0,31-0,36) |
| Puglia | 0,35 (0,33-0,37) |

*I dati disaggregati per le PA di Trento e Bolzano non sono disponibili.

Fonte dei dati: Ministero della Salute. SDO - Istat. Demografia in cifre per la popolazione. Indagine Multiscopo "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2010

Tabella 3 - Tassi standardizzati di dimissioni ospedaliere (per 1.000 e Intervalli di Confidenza al 95%) per BPCO per regione - Anni 2004-2006

| Regioni | 2004 | Regioni | 2005 | Regioni | 2006 |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| Trento | 3,02 (2,68-3,37) | Trento | 3,08 (2,73-3,43) | Trento | 2,52 (2,21-2,83) |
| Piemonte | 4,33 (4,20-4,46) | Piemonte | 4,52 (4,38-4,65) | Piemonte | 3,82 (3,70-3,94) |
| Lombardia | 5,20 (5,09-5,31) | Liguria | 5,14 (4,92-5,35) | Toscana | 4,23 (4,10-4,37) |
| Liguria | 5,42 (5,20-5,64) | Lombardia | 5,29 (5,19-5,40) | Liguria | 4,31 (4,12-4,50) |
| Emilia-Romagna | 5,64 (5,49-5,79) | Toscana | 5,91 (5,75-6,07) | Lombardia | 4,69 (4,59-4,78) |
| Toscana | 5,66 (5,50-5,82) | Emilia-Romagna | 6,18 (6,03-6,33) | Lazio | 5,00 (4,87-5,14) |
| Veneto | 6,55 (6,38-6,71) | Veneto | 6,60 (6,43-6,76) | Emilia-Romagna | 5,17 (5,03-5,31) |
| Friuli-Venezia Giulia | 7,01 (6,70-7,32) | Marche | 7,09 (6,81-7,36) | Veneto | 5,17 (5,02-5,31) |
| Umbria | 7,06 (6,70-7,43) | Umbria | 7,22 (6,86-7,58) | Umbria | 5,67 (5,35-5,99) |
| Bolzano-Bozen | 7,21 (6,62-7,80) | Lazio | 7,27 (7,11-7,44) | Marche | 5,70 (5,45-5,95) |
| Marche | 7,40 (7,11-7,68) | Friuli-Venezia Giulia | 7,41 (7,10-7,73) | Friuli-Venezia Giulia | 6,13 (5,85-6,42) |
| Valle d'Aosta | 7,87 (6,77-8,98) | Valle d'Aosta | 7,74 (6,66-8,82) | Molise | 6,55 (5,96-7,14) |
| Lazio | 8,15 (7,97-8,33) | Bolzano-Bozen | 7,92 (7,30-8,53) | Valle d'Aosta | 6,67 (5,68-7,66) |
| Molise | 8,35 (7,68-9,02) | Basilicata | 8,30 (7,79-8,82) | Bolzano-Bozen | 6,83 (6,27-7,39) |
| Basilicata | 8,38 (7,85-8,90) | Molise | 8,76 (8,08-9,44) | Basilicata | 7,01 (6,54-7,47) |
| Campania | 10,17 (9,95-10,38) | Sicilia | 10,15 (9,94-10,35) | Sardegna | 7,97 (7,65-8,29) |
| Sardegna | 10,47 (10,09-10,84) | Sardegna | 10,22 (9,85-10,58) | Sicilia | 8,23 (8,04-8,41) |
| Sicilia | 10,53 (10,32-10,74) | Campania | 10,34 (10,12-10,55) | Campania | 8,95 (8,76-9,15) |
| Abruzzo | 12,35 (11,94-12,76) | Abruzzo | 12,03 (11,63-12,43) | Abruzzo | 9,28 (8,92-9,63) |
| Puglia | 13,90 (13,63-14,18) | Calabria | 14,06 (13,68-14,44) | Calabria | 12,10 (11,75-12,45) |
| Calabria | 14,35 (13,96-14,74) | Puglia | 14,97 (14,69-15,26) | Puglia | 13,18 (12,92-13,45) |

Nota: la standardizzazione è stata effettuata considerando come popolazione di riferimento la popolazione media residente in Italia nel 2001.

Fonte dei dati e anno di riferimento: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (ex Salute). SDO - Istat. Health For All-Italia per la popolazione. Anno 2008.

Tabella 1 - Tasso (per 1.000 residenti di 65 anni ed oltre) di dimissioni ospedaliere potenzialmente evitabili per BPCO per regione: aggiustamento per età, prevalenza e ospedalizzazione generale e tasso aggiustato solo per età; differenza di posizione tra gli ordinamenti secondo le due misure del tasso - Anno 2010

| Regione | Tasso aggiustato |
|-------------------------|------------------|
| Trentino-Alto Adige | 3,3 (3,1-3,5) |
| Toscana | 3,8 (3,5-4,1) |
| Piemonte-Valle d' Aosta | 3,9 (3,6-4,3) |
| Lombardia | 4,1 (3,9-4,4) |
| Lazio | 4,2 (3,9-4,5) |
| Liguria | 4,3 (4,0-4,7) |
| Veneto | 4,5 (4,2-4,8) |
| Emilia-Romagna | 4,6 (4,3-4,9) |
| Marche | 5,1 (4,7-5,4) |
| Molise | 5,2 (4,8-5,5) |
| Friuli Venezia Giulia | 5,6 (5,2-6,0) |
| Abruzzi | 5,8 (5,4-6,1) |
| Basilicata | 6,0 (5,6-6,5) |
| Umbria | 6,3 (5,8-6,8) |
| Sardegna | 6,6 (6,2-7,0) |
| Sicilia | 6,9 (6,5-7,4) |
| Campania | 7,2 (6,7-7,6) |
| Puglia | 8,9 (8,4-9,4) |
| Calabria | 9,5 (8,9-10,1) |

*I dati disaggregati per le PA di Trento e Bolzano non sono disponibili.

Fonte dei dati: Ministero della Salute. SDO - Istat. Demografia in cifre per la popolazione. Indagine Multiscopo "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2010

Tabella 4 - Tassi standardizzati di dimissioni ospedaliere (per 1.000 e Intervalli di Confidenza al 95%) per insufficienza cardiaca senza procedure cardiache per regione - Anni 2004-2006

| Regioni | 2004 | Regioni | 2005 | Regioni | 2006 |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| Piemonte | 9,82 (9,62-10,01) | Piemonte | 10,05 (9,85-10,25) | Piemonte | 10,09 (9,89-10,28) |
| Umbria | 12,65 (12,17-13,13) | Valle d'Aosta | 12,09 (10,75-13,43) | Valle d'Aosta | 12,34 (11,00-13,68) |
| Sardegna | 12,73 (12,32-13,15) | Umbria | 12,19 (11,73-12,66) | Umbria | 12,91 (12,44-13,39) |
| Valle d'Aosta | 13,86 (12,41-15,32) | Sardegna | 13,17 (12,75-13,58) | Sardegna | 13,22 (12,81-13,63) |
| Liguria | 13,93 (13,59-14,28) | Lombardia | 14,24 (14,07-14,41) | Liguria | 13,83 (13,49-14,17) |
| Trento | 14,20 (13,45-14,95) | Liguria | 14,41 (14,06-14,76) | Lombardia | 14,38 (14,21-14,55) |
| Campania | 14,25 (14,00-14,50) | Lazio | 14,61 (14,37-14,84) | Campania | 14,53 (14,29-14,78) |
| Lombardia | 14,3 (14,13-14,48) | Campania | 14,73 (14,48-14,98) | Lazio | 15,43 (15,19-15,66) |
| Lazio | 14,89 (14,65-15,13) | Sicilia | 15,28 (15,03-15,53) | Sicilia | 15,63 (15,37-15,88) |
| Toscana | 15,55 (15,29-15,81) | Trento | 15,31 (14,54-16,07) | Bolzano-Bozen | 15,83 (14,98-16,67) |
| Abruzzo | 15,56 (15,10-16,01) | Bolzano-Bozen | 15,58 (14,73-16,42) | Puglia | 15,90 (15,61-16,19) |
| Puglia | 15,68 (15,39-15,98) | Puglia | 15,68 (15,39-15,97) | Toscana | 15,92 (15,67-16,18) |
| Sicilia | 16,07 (15,81-16,33) | Abruzzo | 15,70 (15,25-16,16) | Trento | 16,17 (15,40-16,94) |
| Bolzano-Bozen | 16,48 (15,59-17,37) | Toscana | 16,59 (16,32-16,85) | Abruzzo | 16,24 (15,78-16,70) |
| Basilicata | 16,78 (16,05-17,52) | Veneto | 16,69 (16,43-16,95) | Basilicata | 16,61 (15,90-17,33) |
| Emilia-Romagna | 16,84 (16,59-17,10) | Basilicata | 16,76 (16,04-17,49) | Emilia-Romagna | 16,65 (16,40-16,89) |
| Veneto | 17,37 (17,11-17,64) | Emilia-Romagna | 16,84 (16,59-17,10) | Veneto | 16,90 (16,64-17,16) |
| Marche | 17,84 (17,40-18,27) | Marche | 17,73 (17,30-18,16) | Marche | 17,29 (16,88-17,71) |
| Calabria | 19,35 (18,90-19,80) | Molise | 19,20 (18,21-20,19) | Molise | 19,86 (18,86-20,86) |
| Molise | 20,43 (19,40-21,46) | Calabria | 19,83 (19,38-20,27) | Friuli-Venezia Giulia | 20,11 (19,60-20,61) |
| Friuli-Venezia Giulia | 20,85 (20,32-21,37) | Friuli-Venezia Giulia | 20,33 (19,81-20,85) | Calabria | 20,16 (19,71-20,61) |

Nota: la standardizzazione è stata effettuata considerando come popolazione di riferimento la popolazione media residente in Italia nel 2001.

Fonte dei dati e anno di riferimento: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (ex Salute). SDO - Istat. Health For All-Italia per la popolazione. Anno 2008.

Tabella 1 - Tasso (per 1.000 residenti di 65 anni ed oltre) di dimissioni ospedaliere potenzialmente evitabili per Insufficienza Cardiaca senza procedure cardiache per regione: aggiustamento per età, prevalenza di fattori di rischio e ospedalizzazione generale e tasso aggiustato solo per età; differenza di posizione tra gli ordinamenti secondo le due misure del tasso - Anno 2010

| Regione | Tasso aggiustato |
|-------------------------|------------------|
| Sardegna | 11,4 (10,9-12,0) |
| Piemonte-Valle d' Aosta | 11,6 (10,9-12,4) |
| Trentino-Alto Adige | 11,9 (11,3-12,4) |
| Puglia | 13,4 (12,8-14,0) |
| Lombardia | 13,4 (12,8-14,1) |
| Lazio | 13,5 (12,9-14,2) |
| Umbria | 13,6 (12,8-14,4) |
| Abruzzi | 13,9 (13,2-14,5) |
| Campania | 13,9 (13,2-14,6) |
| Liguria | 14,1 (13,3-15,0) |
| Toscana | 14,3 (13,5-15,2) |
| Emilia Romagna | 14,7 (14,0-15,5) |
| Veneto | 15,5 (14,8-16,3) |
| Sicilia | 15,6 (14,8-16,4) |
| Marche | 16,4 (15,5-17,3) |
| Basilicata | 16,5 (15,6-17,5) |
| Molise | 17,4 (16,5-18,3) |
| Friuli-Venezia Giulia | 18,2 (17,3-19,2) |
| Calabria | 18,7 (17,7-19,7) |

*I dati disaggregati per le PA di Trento e Bolzano non sono disponibili.

Fonte dei dati: Ministero della Salute. SDO - Istat. Demografia in cifre per la popolazione. Indagine Multiscopo "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2010