

Tabella 1 - Tassi standardizzati (per 1.000 e Intervalli di Confidenza al 95%) di dimissioni ospedaliere potenzialmente evitabili per asma per regione - Anni 2004-2006

Regioni	2004	Regioni	2005	Regioni	2006
Piemonte	0,10 (0,10-0,11)	Valle d'Aosta	0,10 (0,07-0,13)	Trento	0,06 (0,04-0,08)
Friuli-Venezia Giulia	0,13 (0,12-0,14)	Piemonte	0,11 (0,11-0,12)	Piemonte	0,08 (0,07-0,09)
Marche	0,13 (0,12-0,14)	Marche	0,12 (0,11-0,13)	Marche	0,09 (0,08-0,11)
Emilia-Romagna	0,14 (0,14-0,15)	Basilicata	0,13 (0,11-0,15)	Friuli-Venezia Giulia	0,10 (0,08-0,11)
Valle d'Aosta	0,15 (0,11-0,19)	Trento	0,14 (0,12-0,16)	Toscana	0,10 (0,09-0,12)
Toscana	0,16 (0,15-0,16)	Emilia-Romagna	0,14 (0,14-0,15)	Emilia-Romagna	0,11 (0,10-0,12)
Trento	0,16 (0,14-0,18)	Friuli-Venezia Giulia	0,15 (0,14-0,16)	Veneto	0,12 (0,11-0,13)
Lazio	0,20 (0,19-0,20)	Toscana	0,15 (0,14-0,16)	Liguria	0,12 (0,10-0,14)
Lombardia	0,20 (0,20-0,21)	Liguria	0,17 (0,15-0,19)	Bolzano-Bozen	0,12 (0,08-0,15)
Veneto	0,21 (0,20-0,22)	Sicilia	0,17 (0,16-0,18)	Lombardia	0,12 (0,12-0,13)
Umbria	0,21 (0,19-0,23)	Lazio	0,18 (0,17-0,19)	Lazio	0,13 (0,12-0,14)
Sicilia	0,22 (0,22-0,23)	Veneto	0,19 (0,18-0,20)	Sicilia	0,14 (0,13-0,15)
Campania	0,23 (0,23-0,24)	Lombardia	0,19 (0,18-0,20)	Valle d'Aosta	0,14 (0,07-0,22)
Liguria	0,23 (0,22-0,25)	Umbria	0,20 (0,18-0,22)	Basilicata	0,16 (0,13-0,20)
Basilicata	0,23 (0,21-0,26)	Puglia	0,25 (0,23-0,26)	Umbria	0,18 (0,15-0,21)
Calabria	0,25 (0,24-0,26)	Calabria	0,26 (0,25-0,28)	Campania	0,20 (0,19-0,22)
Bolzano-Bozen	0,26 (0,23-0,28)	Campania	0,27 (0,26-0,28)	Puglia	0,21 (0,20-0,23)
Puglia	0,28 (0,27-0,28)	Bolzano-Bozen	0,27 (0,24-0,30)	Calabria	0,21 (0,19-0,24)
Abruzzo	0,31 (0,30-0,33)	Abruzzo	0,30 (0,28-0,32)	Molise	0,22 (0,16-0,27)
Molise	0,33 (0,30-0,37)	Molise	0,32 (0,28-0,36)	Abruzzo	0,23 (0,21-0,26)
Sardegna	0,42 (0,40-0,44)	Sardegna	0,39 (0,37-0,41)	Sardegna	0,32 (0,29-0,35)
Italia	0,21 (0,20-0,21)	Italia	0,19 (0,19-0,20)	Italia	0,14 (0,14-0,15)

Nota: la standardizzazione è stata effettuata considerando come popolazione di riferimento la popolazione italiana al censimento del 2001.

Fonte dei dati e anno di riferimento: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (ex Salute). SDO - Istat. www.demo.istat.it per la popolazione. Anno 2008.

Tabella 2 - Tassi standardizzati (per 1.000 e Intervalli di Confidenza al 95%) di dimissioni ospedaliere potenzialmente evitabili per CLTD per regione - Anni 2004-2006

Regioni	2004	Regioni	2005	Regioni	2006
Marche	0,17 (0,16-0,18)	Marche	0,13 (0,12-0,15)	Marche	0,19 (0,17-0,21)
Toscana	0,27 (0,26-0,28)	Valle d'Aosta	0,14 (0,09-0,19)	Umbria	0,19 (0,16-0,22)
Valle d'Aosta	0,30 (0,25-0,35)	Umbria	0,21 (0,19-0,23)	Valle d'Aosta	0,22 (0,13-0,31)
Sardegna	0,31 (0,29-0,32)	Toscana	0,26 (0,25-0,28)	Toscana	0,24 (0,23-0,26)
Liguria	0,32 (0,31-0,33)	Sardegna	0,31 (0,29-0,32)	Veneto	0,27 (0,26-0,29)
Emilia-Romagna	0,33 (0,32-0,34)	Liguria	0,31 (0,28-0,34)	Liguria	0,27 (0,25-0,30)
Umbria	0,34 (0,32-0,36)	Piemonte	0,32 (0,30-0,33)	Sardegna	0,29 (0,26-0,32)
Piemonte	0,36 (0,36-0,37)	Emilia-Romagna	0,37 (0,36-0,38)	Friuli-Venezia Giulia	0,31 (0,27-0,34)
Friuli-Venezia Giulia	0,40 (0,39-0,42)	Abruzzo	0,41 (0,38-0,44)	Piemonte	0,31 (0,29-0,32)
Lombardia	0,44 (0,43-0,45)	Trento	0,44 (0,40-0,47)	Emilia-Romagna	0,36 (0,35-0,38)
Abruzzo	0,45 (0,43-0,47)	Lazio	0,44 (0,43-0,45)	Abruzzo	0,39 (0,36-0,43)
Veneto	0,46 (0,45-0,47)	Friuli-Venezia Giulia	0,45 (0,43-0,46)	Trento	0,43 (0,37-0,50)
Trento	0,55 (0,51-0,58)	Lombardia	0,45 (0,44-0,46)	Lombardia	0,48 (0,47-0,50)
Bolzano-Bozen	0,57 (0,53-0,61)	Veneto	0,51 (0,47-0,55)	Bolzano-Bozen	0,52 (0,45-0,60)
Campania	0,58 (0,56-0,59)	Campania	0,52 (0,51-0,53)	Lazio	0,54 (0,52-0,57)
Lazio	0,58 (0,57-0,59)	Bolzano-Bozen	0,55 (0,51-0,59)	Campania	0,55 (0,53-0,57)
Calabria	0,76 (0,74-0,78)	Calabria	0,71 (0,68-0,74)	Calabria	0,68 (0,64-0,72)
Molise	0,78 (0,72-0,83)	Molise	0,76 (0,69-0,84)	Basilicata	0,77 (0,69-0,72)
Puglia	0,91 (0,89-0,93)	Basilicata	0,80 (0,74-0,85)	Sicilia	0,79 (0,77-0,82)
Basilicata	0,92 (0,88-0,97)	Sicilia	0,82 (0,80-0,83)	Puglia	0,88 (0,85-0,92)
Sicilia	0,95 (0,93-0,97)	Puglia	0,85 (0,83-0,87)	Molise	0,94 (0,83-1,05)
Italia	0,51 (0,51-0,51)	Italia	0,47 (0,47-0,48)	Italia	0,47 (0,46-0,47)

Nota: la standardizzazione è stata effettuata considerando come popolazione di riferimento la popolazione italiana al censimento del 2001.

Fonte dei dati e anno di riferimento: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (ex Salute). SDO - Istat. www.demo.istat.it per la popolazione. Anno 2008.

Tabella 1 - Tasso (per 1.000 residenti maggiorenni) di dimissioni ospedaliere potenzialmente evitabili per CLTD per regione: aggiustamento per età, prevalenza e ospedalizzazione generale e tasso aggiustato solo per età; differenza di posizione tra gli ordinamenti secondo le due misure del tasso - Anno 2010

Regione	Tasso aggiustato
Marche	0,08 (0,07-0,09)
Umbria	0,12 (0,11-0,14)
Toscana	0,13 (0,11-0,14)
Sardegna	0,14 (0,13-0,15)
Abruzzo	0,14 (0,13-0,16)
Friuli Venezia Giulia	0,15 (0,14-0,17)
Veneto	0,15 (0,14-0,16)
Liguria	0,15 (0,13-0,16)
Piemonte e Valle d' Aosta	0,17 (0,16-0,19)
Emilia-Romagna	0,18 (0,17-0,20)
Trentino - Alto Adige	0,19 (0,17-0,21)
Lazio	0,22 (0,20-0,23)
Lombardia	0,22 (0,21-0,24)
Campania	0,24 (0,23-0,26)
Calabria	0,25 (0,23-0,27)
Molise	0,27 (0,25-0,30)
Basilicata	0,31 (0,28-0,34)
Sicilia	0,34 (0,31-0,36)
Puglia	0,35 (0,33-0,37)

*I dati disaggregati per le PA di Trento e Bolzano non sono disponibili.

Fonte dei dati: Ministero della Salute. SDO - Istat. Demografia in cifre per la popolazione. Indagine Multiscopo "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2010

Tabella 3 - Tassi standardizzati di dimissioni ospedaliere (per 1.000 e Intervalli di Confidenza al 95%) per BPCO per regione - Anni 2004-2006

Regioni	2004	Regioni	2005	Regioni	2006
Trento	3,02 (2,68-3,37)	Trento	3,08 (2,73-3,43)	Trento	2,52 (2,21-2,83)
Piemonte	4,33 (4,20-4,46)	Piemonte	4,52 (4,38-4,65)	Piemonte	3,82 (3,70-3,94)
Lombardia	5,20 (5,09-5,31)	Liguria	5,14 (4,92-5,35)	Toscana	4,23 (4,10-4,37)
Liguria	5,42 (5,20-5,64)	Lombardia	5,29 (5,19-5,40)	Liguria	4,31 (4,12-4,50)
Emilia-Romagna	5,64 (5,49-5,79)	Toscana	5,91 (5,75-6,07)	Lombardia	4,69 (4,59-4,78)
Toscana	5,66 (5,50-5,82)	Emilia-Romagna	6,18 (6,03-6,33)	Lazio	5,00 (4,87-5,14)
Veneto	6,55 (6,38-6,71)	Veneto	6,60 (6,43-6,76)	Emilia-Romagna	5,17 (5,03-5,31)
Friuli-Venezia Giulia	7,01 (6,70-7,32)	Marche	7,09 (6,81-7,36)	Veneto	5,17 (5,02-5,31)
Umbria	7,06 (6,70-7,43)	Umbria	7,22 (6,86-7,58)	Umbria	5,67 (5,35-5,99)
Bolzano-Bozen	7,21 (6,62-7,80)	Lazio	7,27 (7,11-7,44)	Marche	5,70 (5,45-5,95)
Marche	7,40 (7,11-7,68)	Friuli-Venezia Giulia	7,41 (7,10-7,73)	Friuli-Venezia Giulia	6,13 (5,85-6,42)
Valle d'Aosta	7,87 (6,77-8,98)	Valle d'Aosta	7,74 (6,66-8,82)	Molise	6,55 (5,96-7,14)
Lazio	8,15 (7,97-8,33)	Bolzano-Bozen	7,92 (7,30-8,53)	Valle d'Aosta	6,67 (5,68-7,66)
Molise	8,35 (7,68-9,02)	Basilicata	8,30 (7,79-8,82)	Bolzano-Bozen	6,83 (6,27-7,39)
Basilicata	8,38 (7,85-8,90)	Molise	8,76 (8,08-9,44)	Basilicata	7,01 (6,54-7,47)
Campania	10,17 (9,95-10,38)	Sicilia	10,15 (9,94-10,35)	Sardegna	7,97 (7,65-8,29)
Sardegna	10,47 (10,09-10,84)	Sardegna	10,22 (9,85-10,58)	Sicilia	8,23 (8,04-8,41)
Sicilia	10,53 (10,32-10,74)	Campania	10,34 (10,12-10,55)	Campania	8,95 (8,76-9,15)
Abruzzo	12,35 (11,94-12,76)	Abruzzo	12,03 (11,63-12,43)	Abruzzo	9,28 (8,92-9,63)
Puglia	13,90 (13,63-14,18)	Calabria	14,06 (13,68-14,44)	Calabria	12,10 (11,75-12,45)
Calabria	14,35 (13,96-14,74)	Puglia	14,97 (14,69-15,26)	Puglia	13,18 (12,92-13,45)

Nota: la standardizzazione è stata effettuata considerando come popolazione di riferimento la popolazione media residente in Italia nel 2001.

Fonte dei dati e anno di riferimento: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (ex Salute). SDO - Istat. Health For All-Italia per la popolazione. Anno 2008.

Tabella 1 - Tasso (per 1.000 residenti di 65 anni ed oltre) di dimissioni ospedaliere potenzialmente evitabili per BPCO per regione: aggiustamento per età, prevalenza e ospedalizzazione generale e tasso aggiustato solo per età; differenza di posizione tra gli ordinamenti secondo le due misure del tasso - Anno 2010

Regione	Tasso aggiustato
Trentino-Alto Adige	3,3 (3,1-3,5)
Toscana	3,8 (3,5-4,1)
Piemonte-Valle d' Aosta	3,9 (3,6-4,3)
Lombardia	4,1 (3,9-4,4)
Lazio	4,2 (3,9-4,5)
Liguria	4,3 (4,0-4,7)
Veneto	4,5 (4,2-4,8)
Emilia-Romagna	4,6 (4,3-4,9)
Marche	5,1 (4,7-5,4)
Molise	5,2 (4,8-5,5)
Friuli Venezia Giulia	5,6 (5,2-6,0)
Abruzzi	5,8 (5,4-6,1)
Basilicata	6,0 (5,6-6,5)
Umbria	6,3 (5,8-6,8)
Sardegna	6,6 (6,2-7,0)
Sicilia	6,9 (6,5-7,4)
Campania	7,2 (6,7-7,6)
Puglia	8,9 (8,4-9,4)
Calabria	9,5 (8,9-10,1)

*I dati disaggregati per le PA di Trento e Bolzano non sono disponibili.

Fonte dei dati: Ministero della Salute. SDO - Istat. Demografia in cifre per la popolazione. Indagine Multiscopo "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2010

Tabella 4 - Tassi standardizzati di dimissioni ospedaliere (per 1.000 e Intervalli di Confidenza al 95%) per insufficienza cardiaca senza procedure cardiache per regione - Anni 2004-2006

Regioni	2004	Regioni	2005	Regioni	2006
Piemonte	9,82 (9,62-10,01)	Piemonte	10,05 (9,85-10,25)	Piemonte	10,09 (9,89-10,28)
Umbria	12,65 (12,17-13,13)	Valle d'Aosta	12,09 (10,75-13,43)	Valle d'Aosta	12,34 (11,00-13,68)
Sardegna	12,73 (12,32-13,15)	Umbria	12,19 (11,73-12,66)	Umbria	12,91 (12,44-13,39)
Valle d'Aosta	13,86 (12,41-15,32)	Sardegna	13,17 (12,75-13,58)	Sardegna	13,22 (12,81-13,63)
Liguria	13,93 (13,59-14,28)	Lombardia	14,24 (14,07-14,41)	Liguria	13,83 (13,49-14,17)
Trento	14,20 (13,45-14,95)	Liguria	14,41 (14,06-14,76)	Lombardia	14,38 (14,21-14,55)
Campania	14,25 (14,00-14,50)	Lazio	14,61 (14,37-14,84)	Campania	14,53 (14,29-14,78)
Lombardia	14,3 (14,13-14,48)	Campania	14,73 (14,48-14,98)	Lazio	15,43 (15,19-15,66)
Lazio	14,89 (14,65-15,13)	Sicilia	15,28 (15,03-15,53)	Sicilia	15,63 (15,37-15,88)
Toscana	15,55 (15,29-15,81)	Trento	15,31 (14,54-16,07)	Bolzano-Bozen	15,83 (14,98-16,67)
Abruzzo	15,56 (15,10-16,01)	Bolzano-Bozen	15,58 (14,73-16,42)	Puglia	15,90 (15,61-16,19)
Puglia	15,68 (15,39-15,98)	Puglia	15,68 (15,39-15,97)	Toscana	15,92 (15,67-16,18)
Sicilia	16,07 (15,81-16,33)	Abruzzo	15,70 (15,25-16,16)	Trento	16,17 (15,40-16,94)
Bolzano-Bozen	16,48 (15,59-17,37)	Toscana	16,59 (16,32-16,85)	Abruzzo	16,24 (15,78-16,70)
Basilicata	16,78 (16,05-17,52)	Veneto	16,69 (16,43-16,95)	Basilicata	16,61 (15,90-17,33)
Emilia-Romagna	16,84 (16,59-17,10)	Basilicata	16,76 (16,04-17,49)	Emilia-Romagna	16,65 (16,40-16,89)
Veneto	17,37 (17,11-17,64)	Emilia-Romagna	16,84 (16,59-17,10)	Veneto	16,90 (16,64-17,16)
Marche	17,84 (17,40-18,27)	Marche	17,73 (17,30-18,16)	Marche	17,29 (16,88-17,71)
Calabria	19,35 (18,90-19,80)	Molise	19,20 (18,21-20,19)	Molise	19,86 (18,86-20,86)
Molise	20,43 (19,40-21,46)	Calabria	19,83 (19,38-20,27)	Friuli-Venezia Giulia	20,11 (19,60-20,61)
Friuli-Venezia Giulia	20,85 (20,32-21,37)	Friuli-Venezia Giulia	20,33 (19,81-20,85)	Calabria	20,16 (19,71-20,61)

Nota: la standardizzazione è stata effettuata considerando come popolazione di riferimento la popolazione media residente in Italia nel 2001.

Fonte dei dati e anno di riferimento: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (ex Salute). SDO - Istat. Health For All-Italia per la popolazione. Anno 2008.

Tabella 1 - Tasso (per 1.000 residenti di 65 anni ed oltre) di dimissioni ospedaliere potenzialmente evitabili per Insufficienza Cardiaca senza procedure cardiache per regione: aggiustamento per età, prevalenza di fattori di rischio e ospedalizzazione generale e tasso aggiustato solo per età; differenza di posizione tra gli ordinamenti secondo le due misure del tasso - Anno 2010

Regione	Tasso aggiustato
Sardegna	11,4 (10,9-12,0)
Piemonte-Valle d' Aosta	11,6 (10,9-12,4)
Trentino-Alto Adige	11,9 (11,3-12,4)
Puglia	13,4 (12,8-14,0)
Lombardia	13,4 (12,8-14,1)
Lazio	13,5 (12,9-14,2)
Umbria	13,6 (12,8-14,4)
Abruzzi	13,9 (13,2-14,5)
Campania	13,9 (13,2-14,6)
Liguria	14,1 (13,3-15,0)
Toscana	14,3 (13,5-15,2)
Emilia Romagna	14,7 (14,0-15,5)
Veneto	15,5 (14,8-16,3)
Sicilia	15,6 (14,8-16,4)
Marche	16,4 (15,5-17,3)
Basilicata	16,5 (15,6-17,5)
Molise	17,4 (16,5-18,3)
Friuli-Venezia Giulia	18,2 (17,3-19,2)
Calabria	18,7 (17,7-19,7)

*I dati disaggregati per le PA di Trento e Bolzano non sono disponibili.

Fonte dei dati: Ministero della Salute. SDO - Istat. Demografia in cifre per la popolazione. Indagine Multiscopo "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2010

Tabella 1 - Rischio Relativo di dimissioni ospedaliere per asma per classe di età pediatrica - Anni 2010-2012

Classe di età [*]	RR (95% IC)
0	32,67 (29,61–36,04)
1–4	19,89 (18,08–21,90)
5–9	5,22 (4,74–5,78)
10–14	2,11 (1,90–2,35)

^{*}La classe di età di riferimento è 15–17 anni.

Fonte dei dati: Ministero della Salute. SDO –Istat. Demografia in cifre per la popolazione. Anno 2013.

Tabella 1 – *Rischio Relativo di dimissioni ospedaliere per gastroenteriti per classe di età pediatrica - Anni 2010-2012*

Classe di età [*]	RR (95% IC)
0	29,23 (27,99–30,52)
1–4	21,66 (20,77–22,58)
5–9	5,32 (5,10–5,56)
10–14	2,27 (2,16–2,38)

^{*}La classe di età di riferimento è 15–17 anni.

Fonte dei dati: Ministero della Salute. SDO –Istat. Demografia in cifre per la popolazione. Anno 2013.